


# Infection Control for Gastrointestinal (GI) Illnesses



Update nursing staff of new resident symptoms, like vomiting and/or diarrhea. Be sure that a sign is posted and PPE supplies are available.




Wash hands with soap and water for a minimum of 20 seconds, drying hands with disposable paper towels.



Implement contact precautions (gloves and gowns) for any resident with GI symptoms.


Wear gloves and gown for all patient care activities, or when handling soiled clothes or bedding.



Bag all soiled personal laundry and bag all soiled linens. Do not use shared hamper or place loose in laundry cart.



Increase cleaning and disinfection of common areas and high touch surfaces.




Do not prepare or handle foods for others.



Stay home and out of work for 48 hours (2 days) after symptoms have resolved.

# Control de infecciones en enfermedades gastrointestinales (GI)




Informe al personal de enfermería los síntomas de los nuevos residentes, como vómitos y/o diarrea. Asegúrese de que haya un cartel exhibido y EPP disponible.



Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, y séquelas con toallas de papel desechables.




Implemente precauciones de contacto (guantes y batas) con los residentes con síntomas gastrointestinales. Utilice guantes y bata para todas las actividades de atención al paciente, o cuando manipule ropa o sábanas sucias.



Embolsé toda la ropa sucia personal y la ropa blanca sucia. No utilice la cesta compartida ni la coloque suelta en el carro de la ropa sucia.



Aumente la limpieza y desinfección de zonas comunes y superficies de contacto frecuente.



No prepare ni manipule alimentos para otras personas.



Quédese en casa y no vaya a trabajar durante 48 horas (2 días) después de que hayan desaparecido los síntomas.